

## Confrontando l'immunità naturale SARS-CoV-2 con l'immunità indotta dal vaccino: reinfezione contro infezioni rivoluzionarie

Sivan Gazit , Roei Shlezinger , Galit Perez , Roni Lotan , Asaf Peretz , Amir Ben-Tov , Dani Cohen , Khitam Muhsen , Gabriel Chodick , Tal Patalon

doi: <https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415>

**Questo articolo è una pre stampa e non è stato certificato da peer review [cosa significa?]. Riporta nuove ricerche mediche che devono ancora essere valutate e quindi non dovrebbero essere utilizzate per guidare la pratica clinica.**

[Astratto](#)[Testo intero](#)[Info/Storia](#)[Metrica](#)[Anteprima PDF](#)

### Astratto

**Contesto** Hanno iniziato a emergere rapporti sulla diminuzione dell'immunità indotta dal vaccino contro il COVID-19. Con ciò, la protezione a lungo termine comparabile conferita dalla precedente infezione da SARS-CoV-2 rimane poco chiara.

**Metodi** Abbiamo condotto uno studio osservazionale retrospettivo confrontando tre gruppi: (1) individui naïve alla SARS-CoV-2 che hanno ricevuto un regime a due dosi del vaccino BioNTech/Pfizer mRNA BNT162b2, (2) individui precedentemente infetti che non sono stati vaccinati, e (3) individui precedentemente infetti e vaccinati con una singola dose. Sono stati applicati tre modelli di regressione logistica multivariata. In tutti i modelli abbiamo valutato quattro esiti: infezione da SARS-CoV-2, malattia sintomatica, ospedalizzazione correlata a COVID-19 e morte. Il periodo di follow-up dal 1 giugno al 14 agosto 2021, quando la variante Delta era dominante in Israele.

**Risultati** I vaccinati naïve alla SARS-CoV-2 avevano un rischio aumentato di 13,06 volte (95% CI, da 8,08 a 21,11) di infezione da rottura con la variante Delta rispetto a quelli precedentemente infettati, quando si è verificato il primo evento (infezione o vaccinazione) nel mese di gennaio e febbraio del 2021. L'aumento del

rischio è stato significativo ( $P < 0,001$ ) anche per la malattia sintomatica. Quando si consentiva che l'infezione si verificasse in qualsiasi momento prima della vaccinazione (da marzo 2020 a febbraio 2021), è stata dimostrata la diminuzione dell'immunità naturale, sebbene i vaccinati naïve alla SARS-CoV-2 avessero un 5,96 volte (95% CI, da 4,85 a 7,33) aumento del rischio di infezione improvvisa e aumento del rischio di malattia sintomatica di 7,13 volte (95% CI, 5,51-9,21). I vaccinati naïve alla SARS-CoV-2 erano anche a maggior rischio di ricoveri correlati a COVID-19 rispetto a quelli che erano stati precedentemente infettati.

**Conclusioni** Questo studio ha dimostrato che l'immunità naturale conferisce una protezione più duratura e più forte contro l'infezione, la malattia sintomatica e l'ospedalizzazione causata dalla variante Delta di SARS-CoV-2, rispetto all'immunità indotta dal vaccino a due dosi BNT162b2. Gli individui che erano stati entrambi precedentemente infettati da SARS-CoV-2 e che avevano ricevuto una singola dose del vaccino hanno ottenuto una protezione aggiuntiva contro la variante Delta.

---

## introduzione

Il pesante tributo che l'infezione da SARS-CoV-2 sta assumendo sulla salute globale e sulle risorse sanitarie ha creato l'urgente necessità di stimare quale parte della popolazione è protetta contro COVID-19 in un dato momento al fine di stabilire politiche sanitarie come i blocchi e per valutare la possibilità di immunità di gregge.

Ad oggi, non esiste ancora una correlazione di protezione a lungo termine basata sull'evidenza<sup>1</sup>. Questa mancanza di correlazione della protezione ha portato a diversi approcci in termini di allocazione delle risorse vaccinali, vale a dire la necessità della somministrazione del vaccino nei pazienti guariti, la necessità di colpi di richiamo in individui precedentemente vaccinati o la necessità di vaccinare popolazioni a basso rischio, potenzialmente precedentemente esposte.

L'efficacia a breve termine di un regime a due dosi del vaccino BioNTech/Pfizer BNT162b2 mRNA COVID-19 è stata dimostrata in studi clinici<sup>2</sup> e in contesti osservazionali<sup>3,4</sup>. Tuttavia, l'efficacia a lungo termine tra diverse varianti è ancora sconosciuta, anche se i rapporti di lunga immunità stanno cominciando a superficie, non solo in termini di dinamica di anticorpi nel tempo<sup>5-7</sup>, ma in ambienti del mondo reale, nonché<sup>8</sup>. Oltre alla questione della protezione a lungo termine fornita dal vaccino, rimane poco chiaro anche il grado e la durata con cui la precedente infezione da SARS-CoV-2 offre protezione contro l'infezione ripetuta. A parte la scarsità di studi che esaminano la protezione a lungo termine contro la reinfezione<sup>9</sup>, c'è una sfida nel definire la reinfezione rispetto alla prolungata diffusione virale<sup>10</sup>. Sebbene esistano casi chiari, vale a dire due eventi clinici separati con due distinti virus in sequenza, fare affidamento esclusivamente su questi casi risulterà probabilmente in una sottostima dell'incidenza della reinfezione.

Diversi criteri sulla base di informazioni più ampiamente disponibili sono state proposte <sup>11</sup>, i Centers for Disease Control e le linee guida di prevenzione (CDC) si riferiscono a due positivi SARS-CoV-2 reazione a catena della polimerasi (PCR) i risultati dei test almeno 90 giorni di distanza. <sup>12</sup> Utilizzando criteri simili, studi basati sulla popolazione hanno dimostrato un'immunità naturale <sup>13, 14</sup> senza segni di diminuzione dell'immunità per almeno 7 mesi, sebbene la protezione fosse inferiore per le persone di età pari o superiore a 65 anni <sup>9</sup>.

Il Delta (B.1.617.2) Variant of Concern (VOC), inizialmente identificato in India e oggi diffuso a livello globale, è stato il ceppo dominante in Israele dal giugno 2021. La recente ondata di casi in Israele <sup>15</sup>, uno dei primi paesi di intraprendere una campagna di vaccinazione a livello nazionale (principalmente con il vaccino BioNTech/Pfizer BNT162b2), ha sollevato preoccupazioni sull'efficacia del vaccino contro la variante Delta, inclusi rapporti ufficiali di protezione ridotta <sup>16</sup>. Contemporaneamente, gli studi hanno dimostrato solo lievi differenze nell'efficacia del vaccino a breve termine <sup>17</sup> contro la variante Delta, nonché una sostanziale risposta anticorpale <sup>18</sup>. A parte la variante, la nuova ondata è stata spiegata anche dalla correlazione trovata tra il tempo dal vaccino e i tassi di infezione rivoluzionaria, poiché è stato dimostrato che i vaccinati precoci sono significativamente più a rischio rispetto ai vaccinati tardivi <sup>8</sup>. Ora, quando è trascorso un tempo sufficiente sia dall'inizio della pandemia che dalla diffusione del vaccino, possiamo esaminare la protezione a lungo termine dell'immunità naturale rispetto all'immunità indotta dal vaccino.

A tal fine, abbiamo confrontato i tassi di incidenza delle infezioni rivoluzionarie con i tassi di incidenza della reinfezione, sfruttando il database computerizzato centralizzato di Maccabi Healthcare Services (MHS), la seconda organizzazione israeliana per il mantenimento della salute.

---

## metodi

### Disegno dello studio e popolazione

È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo, sfruttando i dati del database computerizzato centralizzato di MHS. La popolazione dello studio includeva membri MHS di età pari o superiore a 16 anni che erano stati vaccinati prima del 28 febbraio 2021, che avevano un'infezione da SARS-CoV-2 documentata entro il 28 febbraio 2021 o che avevano entrambe un'infezione da SARS-CoV-2 documentata entro febbraio 28, 2021 e ha ricevuto una dose del vaccino entro il 25 maggio 2021, almeno 7 giorni prima del periodo di studio. Il 2 marzo 2021, il Ministero della Salute israeliano ha rivisto le sue linee guida e ha consentito agli individui precedentemente infetti da SARS-CoV-2 di ricevere una dose del vaccino, dopo un intervallo minimo di 3 mesi dalla data dell'infezione

### Origine dei dati

Le cartelle cliniche elettroniche anonime (EMR) sono state recuperate dal database computerizzato centralizzato di MHS per il periodo di studio dal 1 marzo 2020 al 14 agosto 2021.

MHS è un fondo sanitario di 2,5 milioni di membri, su mandato statale, senza fini di lucro, il secondo più grande fondo sanitario in Israele, che copre il 26% della popolazione e fornisce un campione rappresentativo della popolazione israeliana. L'iscrizione ad uno dei quattro fondi sanitari nazionali è obbligatoria, mentre tutti i cittadini devono scegliere liberamente uno dei quattro fondi, ai quali è vietato per legge negare l'adesione a qualsiasi residente. MHS ha mantenuto un database centralizzato di EMR per tre decenni, con un tasso di disimpegno inferiore all'1% tra i suoi membri, consentendo un follow-up medico longitudinale completo. Il set di dati centralizzato include ampi dati demografici, misurazioni cliniche, diagnosi e procedure ambulatoriali e ospedaliere, farmaci dispensati, imaging eseguito e dati di laboratorio completi da un unico laboratorio centrale.

## **Estrazione dei dati e definizione delle variabili di studio**

### *Dati relativi al COVID-19*

Sono state acquisite anche informazioni relative al COVID-19, comprese le date della prima e della seconda dose del vaccino e i risultati di eventuali test della reazione a catena della polimerasi (PCR) per SARS-CoV-2, dato che tutti questi test sono registrati a livello centrale. Sono stati recuperati anche i registri dei ricoveri correlati al COVID-19 ed è stata esaminata la mortalità correlata al COVID-19. Inoltre, le informazioni sui sintomi correlati al COVID-19 sono state estratte dagli EMR, dove sono state registrate dal medico di base o da un'infermiera certificata che ha condotto visite di persona o telefoniche con ciascun individuo infetto.

### *Variabile di esposizione: gruppi di studio*

La popolazione ammissibile allo studio è stata divisa in tre gruppi: (1) individui completamente vaccinati e naïve alla SARS-CoV-2, vale a dire membri MHS che hanno ricevuto due dosi del vaccino BioNTech/Pfizer mRNA BNT162b2 entro il 28 febbraio 2021, non hanno ricevuto il vaccino terza dose entro la fine del periodo di studio e non ha avuto un risultato positivo del test PCR entro il 1 giugno 2021; (2) individui non vaccinati precedentemente infetti, vale a dire membri MHS che avevano un test PCR SARS-CoV-2 positivo registrato entro il 28 febbraio 2021 e che non erano stati vaccinati entro la fine del periodo di studio; (3) precedentemente infetto e individui vaccinati, compresi gli individui che hanno avuto un test PCR SARS-CoV-2 positivo entro il 28 febbraio 2021 e hanno ricevuto una dose del vaccino entro il 25 maggio 2021, almeno 7 giorni prima del periodo di studio. Il gruppo completamente vaccinato era il gruppo di confronto (di riferimento) nel nostro studio. I gruppi 2 e 3 sono stati abbinati al gruppo di confronto 1 in un rapporto 1:1 basato su età, sesso e stato socioeconomico residenziale.

### *Variabili dipendenti*

Abbiamo valutato quattro esiti o secondi eventi correlati a SARS-CoV-2: infezione da SARS-CoV-2 confermata da RT-PCR documentata, COVID-19, ricovero e decesso correlati a COVID-19. I risultati sono stati valutati durante il periodo di follow-up dal 1 giugno al 14 agosto 2021, data dell'analisi, corrispondente al momento in cui la variante Delta è diventata dominante in Israele.

## *covariate*

I dati a livello individuale della popolazione in studio includevano i dati demografici dei pazienti, vale a dire età, sesso, stato socioeconomico (SES) e un'area statistica geografica codificata (GSA, assegnata dall'Ufficio nazionale di statistica israeliano, corrisponde ai quartieri ed è la più piccola unità geostatistica del censimento israeliano). Il SES è misurato su una scala da 1 (il più basso) a 10 e l'indice si basa su diversi parametri, tra cui il reddito familiare, i titoli di studio, l'affollamento delle famiglie e la proprietà dell'auto. Sono stati raccolti anche dati sull'ultimo indice di massa corporea (BMI) documentato e informazioni sulle malattie croniche dai registri automatizzati di MHS, comprese le malattie cardiovascolari <sup>19</sup>, l'ipertensione <sup>20</sup>, il diabete <sup>21</sup>, la malattia renale cronica <sup>22</sup>, broncopneumopatia cronica ostruttiva, condizioni immunocompromesse e cancro dal National Cancer Registry <sup>23</sup>.

## **analisi statistica**

Sono stati applicati due modelli di regressione logistica multivariata che hanno valutato i quattro sopracitati esiti relativi a SARS-CoV-2 come variabili dipendenti, mentre i gruppi di studio erano le principali variabili indipendenti.

### *Modello 1– individui precedentemente infetti vs individui vaccinati, con corrispondenza per l'ora del primo evento*

Nel modello 1, abbiamo esaminato l'immunità naturale e l'immunità indotta dal vaccino confrontando la probabilità di esiti correlati a SARS-CoV-2 tra individui precedentemente infetti che non sono mai stati vaccinati e individui naïve a SARS-CoV-2 completamente vaccinati. Questi gruppi sono stati abbinati in un rapporto 1:1 per età, sesso, GSA e ora del primo evento. Il primo evento (l'esposizione preliminare) è stato il momento della somministrazione della seconda dose del vaccino o il momento dell'infezione documentata con SARS-CoV-2 (un risultato positivo del test RT-PCR), entrambi verificatisi tra il 1 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021. In tal modo, abbiamo abbinato il tempo di "attivazione immunitaria" di entrambi i gruppi, esaminando il protezione a lungo termine conferita quando la vaccinazione o l'infezione si sono verificate nello stesso periodo di tempo. L'intervallo di tre mesi tra il primo evento e il secondo evento è stato implementato al fine di catturare le reinfezioni (al contrario della prolungata diffusione virale) seguendo le linee guida di 90 giorni del CDC.

### *Modello 2*

Nel modello 2, abbiamo confrontato i vaccinati naïve alla SARS-CoV-2 con individui precedentemente infetti non vaccinati mentre *non* corrispondevano intenzionalmente al momento del primo evento (cioè vaccinazione o infezione), al fine di confrontare l'immunità indotta dal vaccino con l'immunità naturale, indipendentemente dal momento dell'infezione. Pertanto, l'abbinamento è stato effettuato in un rapporto 1:1 basato solo su età, sesso e GSA. Simile al modello 1, entrambi gli eventi (vaccinazione o infezione) dovevano verificarsi entro il 28 febbraio, per consentire l'intervallo di 90 giorni. I quattro risultati dello studio SARS-CoV-2 erano gli stessi per questo modello, valutato durante lo stesso periodo di follow-up.

### Modello 3

Il modello 3 ha esaminato individui precedentemente infetti rispetto a individui precedentemente infetti e una volta vaccinati, utilizzando "immunità naturale" come gruppo di riferimento. Abbiamo abbinato i gruppi in un rapporto 1:1 basato su età, sesso e GSA. Gli esiti di SARS-CoV-2 erano gli stessi, valutati durante lo stesso periodo di follow-up.

In tutti e tre i modelli, abbiamo stimato l'immunità naturale rispetto all'immunità indotta dal vaccino per ciascun esito correlato a SARS-CoV-2, applicando la regressione logistica per calcolare l'odds ratio (OR) tra i due gruppi in ciascun modello, con il 95% associato intervalli di confidenza (IC). I risultati sono stati poi aggiustati per le comorbilità sottostanti, tra cui obesità, malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione, malattia renale cronica, cancro e condizioni di immunosoppressione.

Le analisi sono state eseguite utilizzando Python versione 3.73 con il pacchetto del modello stats.  $P < 0,05$  è stato considerato statisticamente significativo.

### Dichiarazione etica

Questo studio è stato approvato dal MHS (Maccabi Healthcare Services) Institutional Review Board (IRB). A causa del disegno retrospettivo dello studio, l'IRB ha rinunciato al consenso informato e tutti i dettagli identificativi dei partecipanti sono stati rimossi prima dell'analisi computazionale.

### Dichiarazione sulla disponibilità dei dati

Secondo i regolamenti del Ministero della Salute israeliano, i dati a livello individuale non possono essere condivisi apertamente. Richieste specifiche per l'accesso remoto ai dati anonimi a livello di comunità devono essere indirizzate a KSM, Maccabi Healthcare Services Research and Innovation Center.

### Disponibilità del codice

Specifiche richieste di accesso remoto al codice utilizzato per l'analisi dei dati vanno rivolte a KSM, Centro Ricerca e Innovazione Maccabi Healthcare Services.

---

## Risultati

Complessivamente, 673.676 membri MHS di età pari o superiore a 16 anni erano idonei per il gruppo di studio di individui naïve alla SARS-CoV-2 completamente vaccinati; 62.883 erano eleggibili per il gruppo di studio di individui precedentemente infetti non vaccinati e 42.099 individui erano eleggibili per il gruppo di studio di vaccinati precedentemente infetti e monodose.

### Modello 1 – individui precedentemente infetti vs individui vaccinati, con corrispondenza per l'ora del primo evento

Nel modello 1, abbiamo abbinato 16.215 persone in ciascun gruppo. Nel complesso, le caratteristiche demografiche erano simili tra i gruppi, con alcune differenze nel loro profilo di comorbilità ( **Tabella 1a** ).

Comprimi in linea

Characteristics	Model 1 – with matching of time of first event		Model 2 – without matching of time of first event	
	Previously infected (n=16,215)	Vaccinated individuals (n=16,215)	Previously infected (n=46,035)	Previously infected and vaccinated (n=46,035)
<b>Age years, mean (SD)</b>	36.1 (13.9)	36.1 (13.9)	36.1 (14.7)	36.1 (14.7)
<b>Age group – no. (%)</b>				
16 to 39 yr	9,889 (61.0)	9,889 (61.0)	28,157 (61.2)	28,157 (61.2)
40 to 59 yr	5,536 (34.1)	5,536 (34.1)	14,973 (32.5)	14,973 (32.5)
≥60 yr	790 (4.9)	790 (4.9)	2,905 (6.3)	2,905 (6.3)
<b>Sex – no. (%)</b>				
Female	7,428 (45.8)	7,428 (45.8)	22,661 (49.2)	22,661 (49.2)
Male	8,787 (54.2)	8,787 (54.2)	23,374 (50.8)	23,374 (50.8)
<b>SES, mean (SD)</b>	5.5 (1.9)	5.5 (1.9)	5.3 (1.9)	5.3 (1.9)
<b>Comorbidities – no. (%)</b>				
Hypertension	1,276 (7.9)	1,569 (9.7)	4,009 (8.7)	4,301 (9.3)
CVD	551 (3.4)	647 (4.0)	1,875 (4.1)	1,830 (4.0)
DM	635 (3.9)	877 (5.4)	2,207 (4.8)	2,100 (4.5)
Immunocompromised	164 (1.0)	420 (2.6)	527 (1.1)	849 (1.8)
Obesity (BMI ≥30)	3,076 (19.0)	3,073 (19.0)	9,117 (19.8)	8,610 (18.7)
CKD	196 (1.2)	271 (1.7)	659 (1.4)	814 (1.8)
COPD	65 (0.4)	97 (0.6)	218 (0.5)	292 (0.6)
Cancer	324 (2.0)	636 (3.9)	1,044 (2.3)	1,364 (3.0)

SD – Standard Deviation; SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10; CVD – Cardiovascular Diseases; DM – Diabetes Mellitus; CKD – Chronic Kidney Disease; COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Comprimi in linea

Characteristics	Previously infected (n=14,029)	Previously infected and single dose vaccinated (n=14,029)
<b>Age years, mean (SD)</b>	33.2 (14.0)	33.2 (14.0)
<b>Age group – no. (%)</b>		
16 to 39 yr	9543 (68.0)	9543 (68.0)
40 to 59 yr	3919 (27.9)	3919 (27.9)
≥60 yr	567 (4.0)	567 (4.0)
<b>Sex – no. (%)</b>		
Female	7467 (53.2)	7467 (53.2)
Male	6562 (46.8)	6562 (46.8)
<b>SES, mean (SD)</b>	4.7 (1.9)	4.7 (1.9)
<b>Comorbidities</b>		
Hypertension	892 (6.4)	1004 (7.2)
CVD	437 (3.1)	386 (2.8)
DM	529 (3.8)	600 (4.3)
Immunocompromised	127 (0.9)	145 (1.0)
Obesity (BMI ≥30)	2599 (18.5)	2772 (19.8)
CKD	137 (1.0)	162 (1.2)
COPD	30 (0.2)	53 (0.4)
Cancer	241 (1.7)	267 (1.9)

SD – Standard Deviation; SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10; CVD – Cardiovascular Diseases; DM – Diabetes Mellitus; CKD – Chronic Kidney Disease; COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Durante il periodo di follow-up sono stati registrati 257 casi di infezione da SARS-CoV-2, di cui 238 si sono verificati nel gruppo vaccinato (infezioni breakthrough) e 19 nel gruppo precedentemente infetto (reinfezioni). Dopo l'aggiustamento per le comorbilità, abbiamo riscontrato un aumento statisticamente significativo di 13,06 volte (95% CI, da 8,08 a 21,11) di infezione da rottura rispetto alla reinfezione ( $P < 0,001$ ). A parte l'età  $\geq 60$  anni, non c'era evidenza statistica che nessuna delle comorbilità valutate influenzasse significativamente il rischio di infezione durante il periodo di follow-up (**Tabella 2a**). Per quanto riguarda le infezioni sintomatiche SARS-COV-2 durante il periodo di follow-up, sono stati registrati 199 casi, di cui 191 nel gruppo vaccinato e 8 nel gruppo precedentemente infetto. I sintomi per tutte le analisi sono stati registrati nel database centrale entro 5 giorni dal test RT-PCR positivo per il 90% dei pazienti e includevano principalmente febbre, tosse, difficoltà respiratorie, diarrea, perdita del gusto o dell'olfatto, mialgia, debolezza, mal di testa e mal di gola. Dopo l'aggiustamento per le comorbilità, abbiamo riscontrato un rischio di 27,02 volte (IC 95%, da 12,7 a 57,5) per l'infezione sintomatica rispetto alla reinfezione sintomatica ( $P < 0,001$ ) (**Tabella 2b**). Nessuna delle covariate era significativa, ad eccezione dell'età  $\geq 60$  anni.

[Comprimi in linea](#)

Variable	Category	$\beta$	OR	95%CI	P-value
<b>Induced Immunity</b>	Previously infected	Ref			
	Vaccinated	2.57	13.06	8.08 – 21.11	<0.001
<b>SES</b>		0.04	1.04	0.97 – 1.11	0.251
<b>Age group, yr.</b>	16-39	Ref			
	40-59	0.05	1.05	0.78 – 1.4	0.751
	$\geq 60$	0.99	2.7	1.68 – 4.34	<0.001
<b>Sex</b>	Female	Ref			
	Male	-0.03	0.97	0.76 – 1.25	0.841
<b>Comorbidities</b>	Obesity (BMI $\geq 30$ )	0.01	1.01	0.73 – 1.39	0.967
	Diabetes mellitus	-0.36	0.7	0.39 – 1.25	0.229
	Hypertension	0.1	1.11	0.72 – 1.72	0.641
	Cancer	0.37	1.44	0.85 – 2.44	0.171
	CKD	0.53	1.7	0.83 – 3.46	0.146
	COPD	-0.46	0.63	0.15 – 2.66	0.529
	Immunosuppression	-0.1	0.91	0.42 – 1.97	0.803
	Cardiovascular diseases	0.26	1.3	0.75 – 2.25	0.343

OR – Odds Ratio; SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10; CVD –

Cardiovascular Diseases; CKD – Chronic Kidney Disease; COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

[Comprimi in linea](#)



Variable	Category	$\beta$	OR	95%CI	P-value
<b>Induced Immunity</b>					
	Previously infected	Ref			
	Vaccinated	3.3	27.02	12.7 – 57.5	<0.001
<b>SES</b>		0.04	1.04	0.96 – 1.12	0.312
<b>Age group, yr.</b>					
	16-39	Ref			
	40-59	0.19	1.21	0.88 – 1.67	0.25
	$\geq 60$	1.06	2.89	1.68 – 4.99	<0.001
<b>Sex</b>					
	Female	Ref			
	Male	-0.19	0.82	0.62 – 1.1	0.185
<b>Comorbidities</b>					
	Obesity (BMI $\geq 30$ )	0.02	1.02	0.71 – 1.48	0.899
	Diabetes mellitus	-0.31	0.73	0.37 – 1.43	0.361
	Hypertension	0.12	1.13	0.69 – 1.85	0.623
	Cancer	0.37	1.45	0.8 – 2.62	0.217
	CKD	0.1	1.1	0.42 – 2.87	0.846
	COPD	-0.78	0.46	0.06 – 3.41	0.445
	Immunosuppression	-0.37	0.69	0.25 – 1.89	0.468
	Cardiovascular diseases	0.03	1.03	0.52 – 2.03	0.941

OR – Odds Ratio; SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10; CVD – Cardiovascular Diseases; CKD – Chronic Kidney Disease; COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Sono stati registrati nove casi di ricoveri correlati al COVID-19, di cui 8 nel gruppo vaccinato e 1 nel gruppo precedentemente infetto ( **Tabella S1** ). Nessun decesso correlato al COVID-19 è stato registrato nelle nostre coorti.


## Modello 2: individui precedentemente infetti vs vaccinati, senza corrispondenza per l'ora del primo evento

Nel modello 2, abbiamo abbinato 46.035 persone in ciascuno dei gruppi (precedentemente infetti vs vaccinati). Le caratteristiche di base dei gruppi sono presentate nella **Tabella 1a** . **La Figura 1** mostra la distribuzione tempestiva della prima infezione negli individui reinfezati. Confrontando gli individui vaccinati con quelli precedentemente infettati in qualsiasi momento (anche durante il 2020), abbiamo scoperto che durante il periodo di follow-up sono stati registrati 748 casi di infezione da SARS-CoV-2, 640 dei quali erano nel gruppo vaccinato (breakthrough infezioni) e 108 nel gruppo precedentemente infetto (reinfezioni). Dopo l'aggiustamento per le comorbidità, è stato possibile osservare un aumento del rischio di 5,96 volte (IC 95%, da 4,85 a 7,33) un aumento del rischio di infezione da rottura rispetto alla reinfezione (  $P < 0,001$  ) ( **Tabella 3a** ). A parte il livello di SES e l'età  $\geq 60$ , che sono rimasti significativi anche in questo modello, non c'erano prove statistiche che nessuna delle comorbidità influisse significativamente sul rischio di infezione.

[Comprimi in linea](#)

Variable	Category	$\beta$	OR	95%CI	P-value
<b>Induced Immunity</b>					
	Previously infected	Ref			
	Vaccinated	1.78	5.96	4.85 – 7.33	<0.001
<b>SES</b>		0.07	1.07	1.03 – 1.11	<0.001
<b>Age group, yr.</b>					
	16-39	Ref			
	40-59	0.06	1.06	0.9 – 1.26	0.481
	$\geq 60$	0.79	2.2	1.66 – 2.92	<0.001
<b>Sex</b>					
	Female	Ref			
	Male	-0.01	0.99	0.85 – 1.14	0.842
<b>Comorbidities</b>					
	Obesity (BMI $\geq 30$ )	0.12	1.13	0.94 – 1.36	0.202
	Diabetes mellitus	-0.15	0.86	0.61 – 1.22	0.4
	Hypertension	-0.12	0.89	0.67 – 1.17	0.402
	Cancer	0.2	1.22	0.85 – 1.76	0.283
	CKD	0.3	1.35	0.85 – 2.14	0.207
	COPD	0.48	1.62	0.88 – 2.97	0.121
	Immunosuppression	-0.03	0.98	0.57 – 1.66	0.925
Cardiovascular diseases	0.08	1.09	0.77 – 1.53	0.638	

OR – Odds Ratio; SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10; CVD – Cardiovascular Diseases; CKD – Chronic Kidney Disease; COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease.



Scarica la figura

Apri in una nuova scheda

**Figura 1.**

Tempo di prima infezione in quelli reinfettati tra giugno e agosto 2021, modello 2.

Complessivamente sono stati registrati 552 casi sintomatici di SARS-CoV-2, 484 nel gruppo vaccinato e 68 nel gruppo precedentemente infetto. C'è stato un aumento del rischio di 7,13 volte (95% CI, 5,51-9,21) di infezione sintomatica sintomatica rispetto alla reinfezione sintomatica ( **Tabella 3b** ). I ricoveri correlati al COVID-19 si sono verificati rispettivamente in 4 e 21 dei gruppi di reinfezione e infezione rivoluzionaria. Gli

individui vaccinati hanno avuto un aumento di 6,7 volte (95% CI, da 1,99 a 22,56) per essere ammessi rispetto agli individui guariti. Avere 60 anni o più ha aumentato significativamente il rischio di ricoveri per COVID-19 ( **Tabella S2** ). Non sono stati registrati decessi correlati al COVID-19.

[Comprimi in linea](#)

Variable	Category	$\beta$	OR	95%CI	P-value
<b>Induced Immunity</b>					
	Previously infected	Ref			
	Vaccinated	1.96	7.13	5.51 – 9.21	<0.001
SES		0.07	1.07	1.02 – 1.12	0.003
<b>Age group, yr.</b>					
	16-39	Ref			
	40-59	0.09	1.1	0.9 – 1.33	0.35
	≥60	0.8	2.23	1.61 – 3.09	<0.001
<b>Sex</b>					
	Female	Ref			
	Male	-0.02	0.98	0.82 – 1.16	0.785
<b>Comorbidities</b>					
	Obesity (BMI≥30)	0.16	1.18	0.95 – 1.46	0.133
	Diabetes mellitus	-0.11	0.89	0.61 – 1.32	0.571
	Hypertension	-0.01	0.99	0.72 – 1.35	0.943
	Cancer	0.08	1.09	0.7 – 1.69	0.71
	CKD	0.13	1.14	0.65 – 1.98	0.654
	COPD	0.5	1.65	0.82 – 3.31	0.162
	Immunosuppression	0	1	0.54 – 1.85	0.999
	Cardiovascular diseases	0	1	0.67 – 1.5	0.99

OR – Odds Ratio; SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10; CVD –

Cardiovascular Diseases; CKD – Chronic Kidney Disease; COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

### Modello 3 - individui precedentemente infetti vs individui vaccinati e precedentemente infetti

Nel modello 3 abbiamo abbinato 14.029 persone. Le caratteristiche di base dei gruppi sono presentate nella **Tabella 1b** . Esaminando gli individui precedentemente infetti rispetto a quelli che erano entrambi precedentemente infetti e che hanno ricevuto una singola dose del vaccino, abbiamo scoperto che quest'ultimo gruppo aveva un rischio ridotto di 0,53 volte (95% CI, da 0,3 a 0,92) ( **Tabella 4a** ) di reinfezione, poiché 20 avevano un test RT-PCR positivo, rispetto a 37 nel gruppo precedentemente infetto e non vaccinato. La malattia sintomatica era presente in 16 vaccinati a dose singola e in 23 dei loro omologhi non vaccinati. Un ricovero per COVID-19 si è verificato nel gruppo precedentemente infetto non vaccinato. Non è stata registrata alcuna mortalità correlata al COVID-19.

[Comprimi in linea](#)

Variable	Category	B	OR	95%CI	P-value
<b>Induced Immunity</b>					
	Previously infected	Ref			
	Previously infected and vaccinated	-0.64	0.53	0.3 – 0.92	0.024
<b>SES</b>		0.11	1.12	0.98 – 1.28	0.096
<b>Age group, yr.</b>					
	16-59	Ref			
	≥60	-0.81	0.44	0.06 – 3.22	0.422
<b>Comorbidities</b>					
	Immunosuppression	0.72	2.06	0.28 – 15.01	0.475

SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10

Comprimi in linea

Variable	Category	B	OR	95%CI	P-value
<b>Induced Immunity</b>					
	Previously infected	Ref			
	Previously infected and vaccinated	-0.43	0.65	0.34 – 1.25	0.194
<b>SES</b>		0.06	1.06	0.9 – 1.24	0.508
<b>Age group, yr.</b>					
	16-59	Ref			
	≥60	-16.9	0	0.0 – inf	0.996
<b>Comorbidities</b>					
	Immunosuppression	1.15	3.14	0.43 – 23.01	0.26

OR – Odds Ratio; SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10.

Abbiamo condotto un'ulteriore sottoanalisi, obbligando a somministrare il vaccino monodose *dopo* il test RT-PCR positivo. Questo sottoinsieme rappresentava l'81% del gruppo di studio precedentemente infetto e vaccinato. Durante l'esecuzione di questa analisi, abbiamo riscontrato un andamento simile, sebbene non significativo, di riduzione del rischio di reinfezione, con un OR di 0,68 (IC 95%, 0,38-1,21 , valore  $P=0,188$ ).

## Discussione

Questo è il più grande studio osservazionale del mondo reale che confronta l'immunità naturale, ottenuta attraverso la precedente infezione da SARS-CoV-2, con l'immunità indotta dal vaccino, offerta dal vaccino mRNA BNT162b2. La nostra ampia coorte, resa possibile dal rapido lancio da parte di Israele della campagna di vaccinazione di massa, ci ha permesso di indagare sul rischio di ulteriori infezioni - sia un'infezione rivoluzionaria in individui vaccinati o una reinfezione in quelli precedentemente infetti - per un periodo più lungo di quanto descritto finora.

La nostra analisi dimostra che i vaccinati naïve alla SARS-CoV-2 avevano un rischio aumentato di 13,06 volte di infezione da rottura con la variante Delta rispetto a quelli precedentemente infettati, quando si è verificato il primo evento (infezione o vaccinazione) nei mesi di gennaio e febbraio del 2021. L'aumento del rischio era significativo anche per una malattia sintomatica.

Ampliando la domanda di ricerca per esaminare l'entità del fenomeno, abbiamo permesso che l'infezione si verificasse in qualsiasi momento tra marzo 2020 e febbraio 2021 (quando diverse varianti erano dominanti in Israele), rispetto alla vaccinazione solo a gennaio e febbraio 2021. Sebbene i risultati potrebbero suggerire il declino dell'immunità naturale contro la variante Delta, quelli vaccinati hanno ancora un rischio aumentato di 5,96 volte di infezione da rottura e un rischio maggiore di 7,13 volte di malattia sintomatica rispetto a quelli precedentemente infetti. I vaccinati naïve alla SARS-CoV-2 erano anche a maggior rischio di ospedalizzazione correlata al COVID-19 rispetto a quelli che erano stati precedentemente infettati.

Gli individui che sono stati precedentemente infettati da SARS-CoV-2 sembrano ottenere una protezione aggiuntiva da un successivo regime di vaccino a dose singola. Sebbene questo risultato corrisponda ai rapporti precedenti <sup>24, 25</sup>, non siamo stati in grado di dimostrare un significato nella nostra coorte.

La tutela conferita dal vantaggiosa immunità naturale che questa analisi dimostra potrebbe essere spiegato con la più ampia risposta immunitaria alle proteine SARS-CoV-2 rispetto a quella generata dal anti-picco attivazione della proteina immunitaria conferita dal vaccino <sup>26, 27</sup>. Tuttavia, poiché un correlato della protezione deve ancora essere dimostrato <sup>1, 28</sup>, compreso il ruolo delle cellule B <sup>29</sup> e dell'immunità delle cellule T <sup>30, 31</sup>, questa rimane un'ipotesi.

Il nostro studio ha diversi limiti. Innanzitutto, poiché la variante Delta era il ceppo dominante in Israele durante il periodo di esito, non è possibile accertare la minore protezione a lungo termine del vaccino rispetto a quella fornita dalla precedente infezione contro altri ceppi. In secondo luogo, la nostra analisi ha affrontato la protezione offerta esclusivamente dal vaccino BioNTech/Pfizer mRNA BNT162b2, e quindi non affronta altri vaccini o la protezione a lungo termine dopo una terza dose, la cui distribuzione è in corso in Israele. Inoltre, poiché questo è uno studio osservazionale del mondo reale, in cui lo screening PCR non è stato eseguito dal protocollo, potremmo sottovalutare le infezioni asintomatiche, poiché questi individui spesso non vengono testati.

Infine, sebbene abbiamo controllato per età, sesso e regione di residenza, i nostri risultati potrebbero essere influenzati dalle differenze tra i gruppi in termini di comportamenti sanitari (come il distanziamento sociale e l'uso della maschera), un possibile fattore di confusione che non è stato valutato. Poiché gli individui con malattie croniche sono stati vaccinati principalmente tra dicembre e febbraio, è necessario considerare la possibilità di confondere per indicazione; tuttavia, l'aggiustamento per obesità, malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione, malattia renale cronica, malattia polmonare ostruttiva cronica, cancro e immunosoppressione ha avuto solo un piccolo impatto sulla stima dell'effetto rispetto all'OR non aggiustato. Pertanto, è improbabile una confusione residua dovuta a fattori non misurati.

Questa analisi ha dimostrato che l'immunità naturale offre una protezione più duratura e più forte contro l'infezione, la malattia sintomatica e l'ospedalizzazione a causa della variante Delta di SARS-CoV-2, rispetto all'immunità indotta dal vaccino a due dosi BNT162b2. In particolare, le persone che erano state precedentemente infettate da SARS-CoV-2 e avevano ricevuto una singola dose del vaccino BNT162b2 hanno ottenuto una protezione aggiuntiva contro la variante Delta. La protezione a lungo termine fornita da una terza dose, recentemente somministrata in Israele, è ancora sconosciuta.

## Disponibilità dei dati

Secondo i regolamenti del Ministero della Salute israeliano, i dati a livello individuale non possono essere condivisi apertamente. Richieste specifiche per l'accesso remoto ai dati anonimi a livello di comunità devono essere indirizzate a KSM, Maccabi Healthcare Services Research and Innovation Center.

## Tabelle e figure

Comprimi in linea

Variable	Category	B	OR	95%CI	P-value
			hospitalized		
<b>Induced Immunity</b>					
	Previously infected	Ref			
	Vaccinated	2.09	8.06	1.01 – 64.55	0.049
SES		0.05	1.05	0.72 – 1.53	0.81
Age ≥60 yrs (16-39, ref)		5.08	160.9	19.91 – 1300.44	<0.001

OR – Odds Ratio; SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10

Comprimi in linea

Variable	Category	B	OR	95%CI	P-value
			hospitalized		
<b>Induced Immunity</b>					
	Previously infected	Ref			
	Vaccinated	1.95	7.03	2.1 – 23.59	0.002
SES		-0.07	0.93	0.74 – 1.17	0.547
Age ≥60 yrs (16-39, ref)		4.3	73.5	25.09 – 215.29	<0.001

OR – Odds Ratio; SES – Socioeconomic status on a scale from 1 (lowest) to 10

## Note a piè di pagina

- Gli autori dichiarano di non avere conflitti di interesse.
- **Finanziamento:** non sono stati previsti finanziamenti esterni per il progetto.

Pdf by:  
<https://www.pro-memoria.info>

## Riferimenti

1. ↵Krammer F. È urgentemente necessario un correlato di protezione per i vaccini SARS-CoV-2. *Nat Med* 2021 277 [Internet] 2021 [citato il 9 agosto 2021]; **27** ( 7 ): 1147 – 8 . Disponibile da: <https://www.nature.com/articles/s41591-021-01432-4> [Google Scholar](#)
2. ↵Polack FP , Thomas SJ , Kitchin N , et al. Sicurezza ed efficacia del vaccino BNT162b2 mRNA Covid-19 . *N Engl J Med* [Internet] 2020 [cit. 2021 Mar 10]; **383** ( 27 ): 2603 – 15 . Disponibile da: <http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577> [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
3. ↵Dagan N , Barda N , Kepten E , et al. Vaccino Covid-19 a mRNA BNT162b2 in un contesto di vaccinazione di massa a livello nazionale . *N Engl J Med* [Internet] 2021 [citato il 20 aprile 2021]; **384** ( 15 ). Disponibile da: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33626250/> [Google Scholar](#)
4. ↵Chodick G , Tene L , Rotem RS , et al. L'efficacia del vaccino BNT162b2 a due dosi: analisi dei dati del mondo reale . *Clin Infect Dis* [Internet] 2021 [citato il 22 luglio 2021]; Disponibile su: <https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab438/6276888> [Google Scholar](#)
5. ↵Seow J , Graham C , Merrick B , et al. Osservazione longitudinale e declino delle risposte anticorpali neutralizzanti nei tre mesi successivi all'infezione da SARS-CoV-2 nell'uomo . *Nat Microbiol* [Internet] 2020 ; **5** ( 12 ): 1598 – 607 . Disponibile da: <https://doi.org/10.1038/s41564-020-00813-8> [Google Scholar](#)
6. Ruopp MD , Strymish J , Dryjowicz-Burek J , Creedon K , Gupta K. Durata dell'anticorpo IgG SARS-CoV-2 tra i residenti in una comunità di assistenza a lungo termine . *J Am Med Dir Assoc* [Internet] 2021 ; **22** ( 3 ): 510 – 1 . Disponibile da: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33515497> [Google Scholar](#)
7. ↵Shrotri M , Navaratnam AMD , Nguyen V , et al. Spike-anticorpo che diminuisce dopo la seconda dose di BNT162b2 o ChAdOx1 . *Lancet* [Internet] 2021 [citato il 22 luglio 2021]; **0** ( 0 ). Disponibile da: <http://www.thelancet.com/article/S0140673621016421/fulltext> [Google Scholar](#)
8. ↵Mizrahi B , Lotan R , Kalkstein N , et al. Correlazione delle infezioni rivoluzionarie SARS-CoV-2 al tempo dal vaccino; Studio preliminare . *medRxiv* [Internet] 2021 [citato il 12 agosto 2021]; 2021.07.29.21261317. Disponibile da: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.29.21261317v1> [Google Scholar](#)
9. ↵Hansen CH , Michlmayr D , Gubbels SM , Mølbak K , Ethelberg S. Valutazione della protezione contro la reinfezione da SARS-CoV-2 tra 4 milioni di individui sottoposti a PCR in Danimarca nel 2020: uno studio osservazionale a livello di popolazione . *Lancet* [Internet] 2021 [citato il 12 agosto 2021]; **397** ( 10280 ): 1204 – 12 . Disponibile da: <http://www.thelancet.com/article/S0140673621005754/fulltext> [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
10. ↵Iwasaki A. Cosa significano le reinfezioni per COVID-19 . *Lancet Infect Dis* 2021 ; **21** ( 1 ): 3 – 5 . [PubMed](#) [Google Scholar](#)
11. ↵Tomassini S , Kotecha D , Bird PW , Folwell A , Biju S , Tang JW . Impostazione dei criteri per la reinfezione da SARS-CoV-2: sei possibili casi . *J Infettare* 2020 ; [Google Scholar](#)
12. ↵CDC . *Reinfezione* [Internet]. 2020 ;( 4 marzo 2020). Disponibile da: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/reinfection.html> [Google Scholar](#)
13. ↵Perez G , Banon T , Gazit S , et al. Una proporzione di reinfezione da SARS-CoV-2 da 1 a 1000 nei membri di un grande operatore sanitario in Israele: un rapporto preliminare . *medRxiv* [Internet] 2021 ;2021.03.06.21253051. Disponibile da: <http://medrxiv.org/content/early/2021/03/08/2021.03.06.21253051.abstract> [Google Scholar](#)
14. ↵Lumley SF , O'Donnell D , Stoesser NE , et al. Stato anticorpale e incidenza dell'infezione da SARS-CoV-2 negli operatori sanitari . *N Engl J Med* [Internet] 2021 [citato 2021 Mar 15]; **384** ( 6 ): 533 – 40 . Disponibile da:

<http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034545> [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)

15. ↩ COVID-19 nel cruscotto di Israele . 2021 ; [Google Scholar](#)
  
16. ↩ Declino dell'efficacia del vaccino contro le infezioni e le malattie sintomatiche [Internet] . [citato il 22 luglio 2021]. Disponibile da: <https://www.gov.il/en/Departments/news/05072021-03> [Google Scholar](#)
  
17. ↩ Bernal JL , Andrews N , Gower C , et al. *Efficacia dei vaccini Covid-19 contro la variante B.1.617.2 (Delta)* . <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2108891> [Internet] 2021 [citato il 22 luglio 2021]; NEJMoa2108891. Disponibile da: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891> [Google Scholar](#)
  
18. ↩ Lustig Y , Zuckerman N , Nemet I , et al. Capacità di neutralizzazione contro Delta (B.1.617.2) e altre varianti preoccupanti a seguito della vaccinazione di Comirnaty (BNT162b2, BioNTech/Pfizer) negli operatori sanitari, Israele . *Eurosurveillance* [Internet] 2021 [cit. 2021 lug 22]; **26** ( 26 ): 2100557 . Disponibile da: <https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.26.2100557> [Google Scholar](#)
  
19. ↩ Shalev V , Chodick G , Goren I , Silber H , Kokia E , Heymann AD . L'uso di un registro automatizzato dei pazienti per gestire e monitorare le condizioni cardiovascolari e gli esiti correlati in una grande organizzazione sanitaria . *Int J Cardiol* [Internet] 2011 [citato il 5 luglio 2021]; **152** ( 3 ): 345 – 9 . Disponibile da: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20826019/> [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
  
20. ↩ DW, GC, VS, CG, EG . Prevalenza e fattori associati all'ipertensione resistente in una grande organizzazione di mantenimento della salute in Israele . *Hypertens (Dallas, Tex 1979)* [Internet] 2014 [cit. 2021 ago 16]; **64** ( 3 ): 501 – 7 . Disponibile da: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24958503/> [Google Scholar](#)
  
21. ↩ Chodick G , Heymann AD , Shalev V , Kookia E. L'epidemiologia del diabete in un grande HMO israeliano . *Eur J Epidemiol* [Internet] 2003 [citato il 4 luglio 2021]; **18** ( 12 ): 1143 – 6 . Disponibile da: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14758871/> [CrossRef](#) [PubMed](#) [Web of Science](#) [Google Scholar](#)
  
22. ↩ Coresh J , Torino TC , Matsushita K , et al. Declino della velocità di filtrazione glomerulare stimata e del conseguente rischio di malattia renale allo stadio terminale e mortalità . *JAMA - J Am Med Assoc* [Internet] 2014 [citato il 4 luglio 2021]; **311** ( 24 ): 2518 – 31 . Disponibile da: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24892770/> [Google Scholar](#)
  
23. ↩ Centro israeliano per il controllo delle malattie. Gerusalemme, io . *Dati da: Registro nazionale dei tumori israeliano* . [Google Scholar](#)
  
24. ↩ Cavanaugh AM . Rischio ridotto di reinfezione da SARS-CoV-2 dopo la vaccinazione COVID-19 - Kentucky, maggio-giugno 2021 . *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* [Internet] 2021 [citato il 13 agosto 2021]; **70** ( 32 ): 1081 – 3 . Disponibile da: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm> [Google Scholar](#)
  
25. ↩ Stamatatos L , Czartoski J , Wan Y-H , et al. La vaccinazione con mRNA aumenta gli anticorpi neutralizzanti cross-varianti provocati dall'infezione da SARS-CoV-2 . *Science (80-)* [Internet] 2021 [citato il 14 agosto 2021]; **372** ( 6549 ): 1413 – 8 . Disponibile da: <https://science.sciencemag.org/content/372/6549/1413> [Abstract / Testo completo GRATUITO](#) [Google Scholar](#)
  
26. ↩ Bettini E , Locci M. Vaccini a mRNA SARS-CoV-2: meccanismo immunologico e oltre . *Vaccini* [Internet] 2021 [cit. 2021 Mar 15]; **9** ( 2 ): 147 . Disponibile da: </pmc/articles/PMC7918810/> [Google Scholar](#)
  
27. ↩ Sette A , Crotty S. Leading Edge Immunità adattativa a SARS-CoV-2 e COVID-19 . *Cell* [Internet] 2021 [citato il 21 agosto 2021]; **184** : 861 – 80 . Disponibile da: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.01.007> [CrossRef](#) [PubMed](#) [Google Scholar](#)
  
28. ↩ Chia WN , Zhu F , Ong SWX , et al. Dinamica delle risposte anticorpali neutralizzanti SARS-CoV-2 e durata dell'immunità: uno studio longitudinale . *The Lancet Microbe* [Internet] 2021 [citato il 14 agosto 2021]; **2** ( 6 ): e240 – 9 . Disponibile da: <http://www.thelancet.com/article/S2666524721000252/fulltext> [Google Scholar](#)



29. ← Cho A , Muecksch F , Schaefer-Babajew D , et al. Evoluzione dell'anticorpo dopo la vaccinazione con mRNA SARS-CoV-2 . *bioRxiv* [Internet] 2021 [citato il 21 agosto 2021];2021.07.29.454333. Disponibile da: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.29.454333v1> [Google Scholar](#)

30. ← Cohen KW , Linderman SL , Moodie Z , et al. L'analisi longitudinale mostra una memoria immunitaria ampia e duratura dopo l'infezione da SARS-CoV-2 con risposte anticorpali persistenti e cellule B e T di memoria . *Cell Report Med* 2021 ; **2** ( 7 ). [Google Scholar](#)

31. ← Lu Z , Laing ED , Pena-Damata J , et al. Durata delle risposte delle cellule T specifiche per SARS-CoV-2 a 12 mesi dopo l'infezione . *bioRxiv* [Internet] 2021 [citato il 21 agosto 2021];2021.08.11.455984. Disponibile da: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.08.11.455984v1> [Google Scholar](#)



### medRxiv Comment Policy

Comments are moderated for offensive or irrelevant content (can take ~24 hours). Duplicated submission is unnecessary. Please read our [Comment Policy](#) before commenting.



0 Comments [medRxiv](#) [Disqus' Privacy Policy](#)

1 Login ▾

Recommend 535

Tweet

Share

Sort by Newest ▾



Start the discussion...

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS

Be the first to comment.

[Subscribe](#) [Add Disqus to your site](#) [Add DisqusAdd](#) [Do Not Sell My Data](#)

[Torna in cima](#)

[Precedente](#)

[Prossimo](#)

Inserito il 25 agosto 2021.

[Scarica il pdf](#)

[Dichiarazioni d'autore](#)

[Dati/Codice](#)

[XML](#)

[E-mail](#)

[Condividere](#)

[Strumenti di citazione](#)