Pdf by:
https://www.pro-memoria.info

Precedente Avanti

Efficacia della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari in Qatar

Tayar, Abdeen, Abed Alah, Chemaitelly, Bougmiza, H. Ayoub, Hassan Kaleeckal, Ali Nizar Latif, Mohammad Shaik, Eid Al-Romaihi, H. Al-Thani, Bertollini, J. Abu-Raddad, Abdullatif Al-Khal

doi: https://doi.org/10.1101/2022.05.09.22274802

Pubblicato il 10 maggio 2022.

Questo articolo è una prestampa e non è stato sottoposto a peer-review [cosa significa?]. Riporta una nuova ricerca medica che deve ancora essere valutata e quindi *non* dovrebbe essere utilizzata per guidare la pratica clinica.

0000606770

Astratto | **Testo integrale** | Info/Storia | Metriche | Anteprima PDF

Scarica il PDF
Email
Opzioni di stampa/salvataggio
Condividi
Strumenti di citazi
Dichiarazioni dell'autore
Dati/Codice

Tweet

Astratto

Un certo numero di studi ha riferito che la vaccinazione antinfluenzale è associata a un minor rischio di morbilità e mortalità da sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e/o malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). Abbiamo condotto uno studio caso-controllo abbinato, negativo al test, per stimare l'efficacia della vaccinazione antinfluenzale, utilizzando il vaccino quadrivalente Influvac Tetra di Abbott, contro l'infezione da SARS-CoV-2 e contro il grave COVID-19. Lo studio è stato implementato su una popolazione di 30.774 operatori sanitari (HCW) in Qatar durante la campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale 2020, tra il 17 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020, prima dell'introduzione della vaccinazione COVID-19. L'età media nei campioni abbinati era di 36 anni (intervallo interquartile (IQR), 32-44) per i casi e 35 anni (IQR, 32-42) per i controlli. La durata mediana tra la vaccinazione antinfluenzale e il test PCR è stata di 43 giorni (IQR, 29-62). L'efficacia stimata della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da SARS-CoV-2 >14 giorni dopo aver ricevuto il vaccino è stata del 29,7% (95% IC: 5,5-47,7%). L'efficacia stimata della vaccinazione antinfluenzale contro qualsiasi COVID-19 grave, critico o fatale è stata dell'88,9% (95% IC: 4,1-98,7%). Le analisi di sensibilità hanno confermato i principali risultati dell'analisi. La recente vaccinazione antinfluenzale è associata a una sensibile riduzione del rischio di infezione da SARS-CoV-2 e gravità del COVID-19.

Introduzione

La vaccinazione antinfluenzale protegge dalle infezioni influenzali e riduce la morbilità e la mortalità dell'influenza stagionale1. Questa vaccinazione è fortemente raccomandata per gruppi ad alto rischio come gli anziani e gli operatori sanitari (HCW)2. Un certo numero di studi hanno riferito che la vaccinazione antinfluenzale è anche associata a un minor rischio di sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2

Prestampa COVID-19 SARS-CoV-2 da medRxiv e bioRxiv

Aree tematiche

Tutti gli articoli

Medicina delle dipendenze
Allergia e immunologia
Anestesia
Medicina cardiovascolare
Odontoiatria e medicina orale
Dermatologia
Medicina d'urgenza
Endocrinologia (incluso diabete mellito e malattie metaboliche)
Epidemiologia
Medicina legale
Gastroenterologia
Medicina genetica e genomica
Medicina geriatrica
Economia sanitaria
Informatica sanitaria
Politica sanitaria
Sistemi sanitari e miglioramento della qu
Ematologia
HIV/AIDS
Malattie Infettive (eccetto HIV/AIDS)
Terapia intensiva e medicina di terapia intensiva
Educazione medica
Etica medica
Nefrologia
Neurologia
Infermieristica
Nutrizione

(SARS-CoV-2) e/o morbilità e mortalità da coronavirus 2019 (COVID-19)[3-12]. Tuttavia, l'apparente protezione riportata contro l'infezione da SARS-CoV-2 e il grave COVID-19 potrebbe essere sorta a causa di pregiudizi e potrebbe non aver riflesso un vero effetto biologico. In particolare, questa protezione potrebbe essere dovuta all'effetto utente sano13, in base al quale le persone attente alla salute hanno maggiori probabilità di ricevere un vaccino antinfluenzale e, contemporaneamente, di praticare comportamenti di salute che riducono il rischio di contrarre l'infezione3,5.

In questo contesto, abbiamo valutato l'efficacia della vaccinazione antinfluenzale, utilizzando il vaccino quadrivalente Influvac Tetra di Abbott, contro l'infezione da SARS-CoV-2 e contro qualsiasi grave (ospedalizzazione in terapia acuta),[14] critico (ospedalizzazione dell'unità di assistenza intensiva), [14] o fatale15 COVID-19 tra gli HCW in Qatar durante la campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale 2020 e prima dell'introduzione della vaccinazione COVID-19. Poiché la variazione dei comportamenti di salute tra gli HCW è presumibilmente inferiore a quella tra la popolazione generale, condurre questo studio tra gli HCW ci ha permesso di ridurre al minimo l'influenza dell'effetto utente sano sulle stime di efficacia.

Metodi

Studia il design

Questo studio è stato condotto tra gli HCW di Hamad Medical Corporation, il principale fornitore di servizi sanitari pubblici in Qatar e l'entità designata a livello nazionale per le esigenze sanitarie legate al COVID-19. Lo studio ha analizzato i database nazionali e federati per i test di laboratorio COVID-19, la vaccinazione, il ricovero in ospedale e la morte, recuperati dalla piattaforma di informazione digitale-salute a livello nazionale integrata. Questi database includono tutti i dati relativi alla SARS-CoV-2 e le informazioni demografiche associate, senza informazioni mancanti, dall'insorgenza della pandemia, documentando tutti i test di reazione a catena della polimerasi (PCR). I dati sulla vaccinazione antinfluenzale sono stati recuperati dal database delle vaccinazioni antinfluenzali della Hamad Medical Corporation. Ulteriori descrizioni di questi database sono state riportate in precedenza16[-22].

Ogni test PCR condotto in Qatar è classificato in base ai sintomi e al motivo del test (sintomi clinici, tracciamento dei contatti, sondaggi o campagne di test casuali, richieste individuali, test sanitari di routine, pre-viaggio, screening nei porti di ingresso o altro). Il Qatar ha una demografia insolitamente giovane e diversificata, in quanto solo il 9% dei suoi residenti ha ≥50 anni e l'89% sono espatriati provenienti da oltre 150 paesi16. Questa diversità si estende alla popolazione HCW.

L'efficacia della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da SARS-CoV-2 è stata valutata utilizzando il design dello studio caso-controllo negativo al test, un progetto preferito per valutare l'efficacia del vaccino contro l'influenza23,24. Questo progetto è stato convalidato anche nella popolazione del Qatar ed è stato ripetutamente applicato in precedenti studi in questo paese per valutare l'efficacia del vaccino COVID-

Supported by Chan Zuckerb Initiativ

1917,19,20,25[-28].

Tutti gli HCW con un test PCR SARS-CoV-2 eseguito tra il 17 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 erano idonei per l'inclusione nello studio. Questa durata ha coinciso con la campagna nazionale annuale di vaccinazione antinfluenzale che in genere inizia a settembre o ottobre e continua per diversi mesi successivi. La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente a tutti i cittadini e residenti. Durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020, è stato utilizzato solo il vaccino quadrivalente Influvac Tetra di Abbott. Lo studio si è concluso all'inizio della campagna di vaccinazione di massa COVID-19. Durante lo studio, l'incidenza della SARS-CoV-2 era dovuta al virus originale della SARS-CoV-2, prima dell'introduzione di varianti SARS-CoV-2 di concern29[-32]. Anche l'incidenza della SARS-CoV-2 è stata relativamente bassa durante lo studio senza alcuna onda che si materializzasse durante questo periodo33.

Per stimare l'efficacia contro l'infezione da SARS-CoV-2, abbiamo esaminato i casi esatti (HCW con test PCR-positivi) e i controlli (HCW con test PCR-negativi) identificati durante lo studio in un rapporto 1:5 per sesso, gruppi di età a 10 anni, gruppi di 10 nazionalità, motivo del test PCR e La corrispondenza di questi fattori è stata dimostrata in precedenza in studi su diversi progetti epidemiologici per fornire un adeguato controllo delle differenze nel rischio di esposizione all'infezione da SARS-CoV-2 in Qatar17,20,22,25,37.

Solo il primo test PCR-positivo per i casi e il primo test PCR-negativo per i controlli durante lo studio sono stati inclusi nell'analisi. I controlli includevano individui senza registrazione di un test PCR-positivo durante il periodo di studio. Sono stati esclusi gli HCW con un test PCR entro 14 giorni dalla ricezione del vaccino antinfluenzale e coloro che hanno ricevuto la vaccinazione COVID-19. Questi criteri di inclusione ed esclusione sono stati implementati per consentire un tempo adeguato per l'accumulo di immunità dopo la vaccinazione19 e per ridurre al minimo diversi tipi di potenziali pregiudizi, come informato da analisi precedenti nella stessa popolazione17,25. Ogni controllo che soddisfaceva i criteri di inclusione e che potesse essere abbinato a un caso è stato incluso nell'analisi.

La classificazione della gravità del caso COVID-1914, della criticità14 e del decesso15 ha seguito le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e le valutazioni sono state effettuate da personale medico addestrato utilizzando revisioni individuali dei grafici, come parte di un protocollo nazionale applicato a ogni paziente COVID-19 ricoverato in ospedale. I dettagli delle classificazioni di gravità, criticità e mortalità del COVID-19 si trovano nella sezione supplementare S1.

Ogni paziente ricoverato in ospedale COVID-19 è stato sottoposto a valutazione della gravità dell'infezione ogni tre giorni fino alla dimissione o alla morte. Abbiamo classificato le persone che sono progredite verso il COVID-19 grave, critico o fatale tra il momento del test PCR-positivo e la fine dello studio in base al loro peggior esito della malattia, a partire dalla morte15, seguita da malattia critica14 e poi da malattia grave14.

Metodi di laboratorio

I dettagli dei metodi di laboratorio per i test PCR a trascrizione inversa in tempo reale (RT-qPCR) si trovano nella sezione supplementare S2. Tutti i test PCR sono stati condotti presso il laboratorio centrale Hamad Medical Corporation o il Sidra Medicine Laboratory, seguendo protocolli standardizzati.

Analisi statistica

Le caratteristiche di base dei casi e dei controlli sono state segnalate utilizzando statistiche descrittive. I gruppi sono stati confrontati utilizzando differenze medie standardizzate (SMD), con SMD vicino a 0,1 che indica una corrispondenza adeguata38. Il factoring di regressione logistica condizionata, il progetto abbinato è stato eseguito per confrontare le probabilità di vaccinazione antinfluenzale nei casi rispetto ai controlli. Questo approccio analitico, compresa la corrispondenza per data del test PCR bisettimanale, riduce al minimo i potenziali pregiudizi dovuti alla variazione della fase epidemica23,39 e all'introduzione della vaccinazione durante lo studio23,39. Le interazioni non sono state prese in considerazione. Le stime risultanti per l'odds ratio rettificato e l'intervallo di confidenza del 95% (CI) sono state quindi utilizzate per stimare l'efficacia della vaccinazione antinfluenzale e il corrispondente IC al 95% utilizzando l'equazione23,24:

$$\text{Influenza vaccination effectiveness} = 1 - \text{odds ratio of influenza vaccination among cases versus controls}$$

L'efficacia è stata stimata contro l'infezione da SARS-CoV-2, sintomatica o asintomatica, e contro qualsiasi COVID-19 grave, critico o fatale. Sono state condotte analisi di sensibilità per studiare l'impatto dell'aggiustamento per l'infezione precedente nella regressione logistica condizionata e per modificare i criteri di inclusione ed espulsione dello studio sulla stima dell'efficacia della vaccinazione antinfluenzale. Quest'ultimo è stato informato da un piano di analisi stabilito per invigare fonti di potenziali pregiudizi17,25 e ha incluso l'esclusione di individui con infezione precedente, l'esclusione dei test PCR relativi ai viaggi o l'inclusione di tutti i test PCR positivi e PCR-negativi per casi e controlli. Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando STATA/SE versione 17.0 (Stata Corporation, College Station, TX, USA).

Supervisione

Hamad Medical Corporation e Weill Cornell Medicine-Qatar Institutional Review Boards hanno approvato questo studio retrospettivo con una rinuncia al consenso informato. La ricerca è stata eseguita in conformità con le linee guida e i regolamenti pertinenti. Lo studio è stato riportato seguendo le linee guida Rafforzare la segnalazione degli studi osservazionali in epidemiologia (STROBE). La lista di controllo STROBE può essere trovata nella **tabella S1.**

Risultati

La figura 1 mostra il processo di selezione della popolazione in studio. Dei 30.774 HCW della Hamad Medical Corporation, 12.015 hanno avuto uno o più test PCR SARS-CoV-2 tra il 17 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Di questi, 576 HCW con un test PCR-positivo e 10.033 con test eccessivamente negativi alla PCR sono stati edibili per l'inclusione nello studio. L'esatta corrispondenza su un rapporto 1:5 ha prodotto 518 casi abbinati a 2.058 controlli.



Figura 1.

Diagramma di flusso che descrive il processo di selezione della popolazione per studiare l'efficacia della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da SARS-CoV-2.

La tabella 1 descrive le caratteristiche demografiche dei casi e dei controlli. L'età media era di 36 anni (intervallo interquartile (IQR), 32-44) per i casi e 35 anni (IQR, 32-42) per i controlli nei campioni abbinati. Poco meno della metà (~ 46%) dei casi e dei controlli erano maschi. I partecipanti erano di diverse nazionalità e quasi due terzi sono stati testati a causa di sintomi simili al COVID. I gruppi di studio abbinati erano ben bilanciati tra i fattori di corrispondenza. La durata mediana tra la vaccinazione antinfluenzale e il test PCR è stata di 43 giorni (IQR, 29-62).

Tabella 1.

Caratteristiche demografiche dei casi (operatori sanitari con test PCR-positivi) e controlli (operatori sanitari con test PCR-negativi).

L'efficacia stimata della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da SARS-CoV-2 >14 giorni dopo aver ricevuto il vaccino è stata del 29,7% (95% IC: 5,5-47,7%). Tutte le analisi di sensibilità hanno prodotto risultati coerenti confermando i principali risultati dell'analisi (Tabella 2).

Tabella 2.

Efficacia della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da SARS-CoV-2 >14 giorni dopo la somministrazione del vaccino e contro qualsiasi COVID-19 grave, critico o fatale.

Dei 127 casi positivi alla PCR che hanno ricevuto la vaccinazione antinfluenzale nei campioni abbinati, solo 1 è progredito verso COVID-19 grave, ma nessuno a COVID-19 critico o fatale (Figura 1). Nel frattempo, dei 391 casi positivi alla PCR che non hanno ricevuto la vaccinazione antinfluenzale, 17 sono passati a gravi, 2 a critici, ma nessuno a COVID-19 fatale. L'efficacia stimata della vaccinazione antinfluenzale contro qualsiasi COVID-19 grave, critico o fatale è stata dell'88,9% (95% IC: 4,1-98,7%; Tabella 2).

Discussione

La recente vaccinazione antinfluenzale è stata associata a una riduzione del 30% del rischio di infezione da SARS-CoV-2 da parte del virus originale, prima dell'introduzione di varianti preoccupanti. La recente

vaccinazione antinfluenzale è stata anche associata a una riduzione del 90% del rischio di grave COVID-19, ma l'intervallo di confidenza del 95% della stima dell'efficacia era ampio. L'incidenza di COVID-19 grave era rara tra i vaccinati, con un solo caso di grave COVID-19 documentato tra di loro.

Questi risultati per una popolazione di HCW in cui l'influenza dell'effetto utente sano è forse ridotta al minimo, supportano la conclusione che la recente vaccinazione antinfluenzale ha un vero effetto biologico nella protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2 e la gravità del COVID-19. I risultati confermano anche i risultati di studi che hanno trovato effetti protettivi simili per la vaccinazione antinfluenzale3[-12], anche se altri studi non lo hanno fatto40,41. Questi risultati possono essere spiegati dalla vaccinazione antinfluenzale che innesca un'attivazione immunitaria non specifica o dall'immunità addestrata o dagli astanti che è protettiva contro l'infezione da SARS-CoV-23[-5,7,42-47].

Questo studio ha dei limiti. È stata studiata l'efficacia della sola vaccinazione antinfluenzale recente. L'analisi non ha preso in considerazione la vaccinazione antinfluenzale delle stagioni precedenti. Tuttavia, dato che l'attivazione immunitaria non specifica potrebbe non durare oltre poche settimane e nel contesto del declino relativamente rapido dell'immunità del vaccino COVID-1917,25,48[-50], l'efficacia osservata della vaccinazione antinfluenzale è probabilmente di breve durata. La corrispondenza è stata fatta per sesso, età, nazionalità, motivo del test PCR e data del test PCR bisettimanale, ma non è stato possibile per altri fattori, come le comorbidità. Tuttavia, la corrispondenza di questi fattori ha controllato con successo il pregiudizio nei nostri studi precedenti17,20,22,25,37. La maggior parte degli HCW nel nostro campione erano anche giovani e avevano meno probabilità di essere affetti da comorbidità. Tuttavia, non si può escludere la possibilità che nei dati del mondo reale, i pregiudizi possano sorgere in modi inaspettati o da fonti sconosciute, come sottili differenze o cambiamenti nel comportamento di ricerca dei test. Con la natura giovane e professionale della nostra popolazione, questi risultati potrebbero non essere generalizzati alla popolazione anziana o alla popolazione generale più ampia.

Nonostante queste limitazioni, sono state condotte un'ampia sensibilità e analisi aggiuntive per studiare gli effetti di potenziali pregiudizi in questo studio e nei nostri studi precedenti che utilizzavano la stessa metodologia. Questi includevano diversi aggiustamenti e controlli nell'analisi e diversi criteri di inclusione ed esclusione dello studio, per indagare se le stime di efficacia avrebbero potuto essere distorte17,25. Queste analisi hanno mostrato risultati coerenti17,25,28,51,52.

In conclusione, la recente vaccinazione antinfluenzale è associata a una sensibile riduzione del rischio di infezione da SARS-CoV-2 e della gravità del COVID-19. I risultati supportano i benefici per la vaccinazione antinfluenzale che vanno oltre la protezione contro l'infezione influenzale e le malattie gravi.

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info

Disponibilità dei dati

Il set di dati di questo studio è una proprietà del Ministero della Salute Pubblica del Qatar che è stato fornito ai ricercatori attraverso un accordo ad accesso limitato che impedisce la condivisione del set di dati con una terza parte o pubblicamente. L'accesso futuro a questo set di dati può essere considerato attraverso una domanda diretta per l'accesso ai dati a Sua Eccellenza il Ministro della Sanità Pubblica (https://www.moph.gov.qa/english/Pages/default.aspx). I dati aggregati sono disponibili all'interno del manoscritto e delle sue informazioni supplementari.

Contributi dell'autore

ET, SA, MAA e AAK hanno co-concepito e co-progettato lo studio, condotto una revisione della letteratura, co-sviluppato il database e co-scritto la prima bozza dell'articolo. HC ha co-progettato lo studio, co-sviluppato il database, eseguito le analisi statistiche e co-scritto la prima bozza dell'articolo. LJA ha co-progettato lo studio, condotto le analisi statistiche e co-scritto la prima bozza dell'articolo. Tutti gli autori hanno contribuito alla raccolta e all'acquisizione dei dati, allo sviluppo di database, alla discussione e all'interpretazione dei risultati e alla scrittura del manoscritto. Tutti gli autori hanno letto e approvato il manoscritto finale.

Disponibilità dei dati

Il set di dati di questo studio è una proprietà del Ministero della Salute Pubblica del Qatar che è stato fornito ai ricercatori attraverso un accordo ad accesso limitato che impedisce la condivisione del set di dati con una terza parte o pubblicamente. L'accesso futuro a questo set di dati può essere considerato attraverso una domanda diretta per l'accesso ai dati a Sua Eccellenza il Ministro della Sanità Pubblica (https://www.moph.gov.qa/english/Pages/default.aspx). I dati aggregati sono disponibili all'interno del manoscritto e delle sue informazioni supplementari.

Appendice supplementare

Sezione supplementare S1. Classificazione della gravità, della criticità e dei decessi COVID-19

La malattia da coronavirus grave 2019 (COVID-19) è stata definita secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come una grave sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV-2) persona infetta da "saturazione di ossigeno <90% all'aria ambiente e/o frequenza respiratoria >30 respiri/minuto negli adulti e nei bambini >5 anni (o ≥60 respiri/minuto nei bambini <2 mesi o ≥50 respiri/minuto nei bambini di 2-11 mesi o ≥40 respiri/minuto nei bambini da 1-5 anni) e/o segni di grave difficoltà respiratorio (uso muscolare accessorio e incapacità di completare frasi complete e, nei bambini, prelievo molto grave della parete toracica, grugnimento, cianosi centrale o presenza di qualsiasi altro segnale di pericolo generale)”1. I criteri dettagliati dell'OMS per classificare la gravità dell'infezione da SARS-CoV-2 sono disponibili nella relazione tecnica dell'OMS1.

La malattia critica da COVID-19 è stata definita secondo la classificazione dell'OMS come una persona infetta da SARS-CoV-2 con "sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi, shock settico o altre condizioni che normalmente richiederebbero la fornitura di terapie che sostengono la vita come la ventilazione meccanica (invasiva o non invasiva) o la terapia vasopressiva"1. I criteri dettagliati dell'OMS per classificare la criticità dell'infezione da SARS-CoV-2 sono disponibili nella relazione tecnica dell'OMS1.

La morte per COVID-19 è stata definita secondo la classificazione dell'OMS come "un decesso derivante da una malattia clinicamente compatibile, in un caso probabile o confermato di COVID-19, a meno che non vi sia una chiara causa alternativa di morte che non può essere correlata alla malattia COVID-19 (ad esempio trauma). Non ci dovrebbe essere alcun periodo di completo recupero dal COVID-19 tra malattia e morte. Un decesso dovuto al COVID-19 potrebbe non essere attribuito a un'altra malattia (ad esempio il cancro) e dovrebbe essere conteggiato indipendentemente dalle condizioni preesistenti che sono sospettate di innescare un grave decorso di COVID-19". I criteri dettagliati dell'OMS per classificare i decessi per COVID-19 sono disponibili nella relazione tecnica dell'OMS2.

Sezione supplementare S2. Metodi di laboratorio

Test di reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa in tempo reale

I tamponi nasofaringei e/o orofaringei sono stati raccolti per i test PCR e collocati in Universal Transport Medium (UTM). Le alitazioni di UTM sono state: estratte su una piattaforma di sinfonia QIA (QIAGEN, USA) e testate con PCR a trascrizione inversa in tempo reale (RT-qPCR) utilizzando i kit combinati TaqPathTM COVID-19 (Thermo Fisher Scientific, USA) su un ABI 7500 FAST (Thermo Fisher, USA); testati direttamente sul sistema Cepheid GeneXpert utilizzando Xpress SARS-CoV-2 (Cepheid, USA); o caricato direttamente in un sistema Roche cobas® 6800 e testato con un test cobas® SARS-CoV-2 (Roche, Svizzera). Il primo test si rivolge alle regioni virali del gene S, N e ORF1ab. Il secondo si rivolge alle regioni virali N ed E-gene e il terzo si rivolge alle regioni ORF1ab ed E-gene.

Tutti i test PCR sono stati condotti presso il laboratorio centrale della Hamad Medical Corporation o il laboratorio di medicina Sidra, seguendo protocolli standardizzati.

Tabella S1.

Rafforzare la lista di controllo Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) per studi caso-controllo.

Fonti di sostegno e riconoscimenti

Riconosciamo le molte persone dedicate presso Hamad Medical Corporation, il Ministero della Salute Pubblica, la Primary Health Care Corporation, la Qatar Biobank, Sidra Medicine e Weill Cornell Medicine-Qatar per i loro diligenti sforzi e contributi per rendere possibile questo studio.

Gli autori sono grati per il sostegno salariale istituzionale del programma di ricerca biomedica e del nucleo di ricerca biostatistica, epidemiologica e biomatematica, sia presso Weill Cornell Medicine-Qatar, sia per il sostegno salariale istituzionale fornito dal Ministero della sanità pubblica, dalla Hamad Medical Corporation e dalla Sidra Medicine. I finanziatori dello studio non hanno avuto alcun ruolo nella progettazione dello studio, nella raccolta dei dati, nell'analisi dei dati, nell'interpretazione dei dati o nella scrittura dell'articolo.

Le dichiarazioni qui rilasciate sono di esclusiva responsabilità degli autori.

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info

Referenze

1. ↵Jackson, M. L. et al. Efficacia del vaccino antinfluenzale negli Stati Uniti durante la stagione 2015-2016. *N Engl J Med* **377**, 534–543, doi:10.1056/NEJMoa1700153 (2017). CrossRef PubMed Google Scholar

2. ↵Pearson, M. L., Ponti, C. B., Harper, S. A., Consulenza sulle pratiche di controllo delle infezioni sanitarie, C. & Comitato consultivo per l'immunizzazione, P. Vaccinazione antinfluenzale del personale sanitario: raccomandazioni del comitato consultivo per le pratiche di controllo delle infezioni sanitarie (HICPAC) e del comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (ACIP). *MMWR Recomm Rep* **55**, 1-16 (2006). PubMed Google Scholar

3. ↵Conlon, A., Ashur, C., Washer, L., Eagle, K. A. & Hofmann Bowman, M. A. Impatto del vaccino antinfluenzale sui tassi di infezione da COVID-19 e sulla gravità. *Am J Infect Control* **49**, 694–700,doi:10.1016/j.ajic.2021.02.012 (2021). CrossRef Google Scholar

4. Fink, G. et al. La vaccinazione antinfluenzale trivalente inattivata è associata a una minore mortalità tra i pazienti con COVID-19 in Brasile. *BMJ Evid Based Med*, doi:10.1136/bmjebm-2020-111549 (2020). Testo integrale astratto/GRATUITO Google Scholar

5. ↵Huang, K., Lin, S. W., Sheng, W. H. & Wang, C. C. Vaccinazione antinfluenzale e rischio di infezione da COVID-19 e gravi malattie negli anziani negli Stati Uniti. *Sci Rep 11,11025*, doi:10.1038/s41598-021-90068-y (2021). CrossRef Google Scholar

6. Taghioff, S. M., Slavin, B. R., Holton, T. & Singh, D. Esaminare i potenziali benefici del vaccino antinfluenzale contro la SARS-CoV-2: un'analisi retrospettiva di coorte di 74.754 pazienti.*PLoS One 16,* e0255541, doi:10.1371/journal.pone.0255541 (2021). CrossRef Google Scholar

7. ↵Debisarun, P. A. et al. Induzione dell'immunità addestrata mediante vaccinazione antinfluenzale - impatto sul COVID-19. *PLoS Pathog 17,* e1009928, doi:10.1371/journal.ppat.1009928 (2021). CrossRef Google Scholar

8. Ragni, P. et al. Associazione tra esposizione alla vaccinazione antinfluenzale e diagnosi ed esiti COVID-19. *Vaccini (Basilea) 8,* doi:10.3390/vaccini8040675 (2020). CrossRef Google Scholar

9. Marin-Hernandez, D., Schwartz, R. E. & Nixon, D. F. Prove epidemiologiche per l'associazione tra un maggiore assorbimento del vaccino antinfluenzale negli anziani e minori decessi per COVID-19 in Italia.*J Med Virol* **93**, 64-65, doi:10.1002/jmv.26120 (2021). CrossRef Google Scholar

10. Massoudi, N. & Mohit, B. Uno studio caso-controllo del vaccino antinfluenzale 2019 e incidenza del COVID-19 tra gli operatori sanitari. *J Clin Immunol* **41**, 324-334, doi:10.1007/s10875-020-00925-0 (2021). CrossRef Google Scholar

11. Pawlowski, C. et al. L'analisi esplorativa dei registri di immunizzazione evidenzia una diminuzione dei tassi di SARS-CoV-2 negli individui con recenti vaccinazioni non-COVID-19. *Sci Rep 11,* 4741,doi:10.1038/s41598-021-83641-y (2021). CrossRef Google Scholar

12. ↵Candelli, M. et al. Effetto del vaccino antinfluenzale sulla mortalità COVID-19: uno studio retrospettivo. *Stagista Emerg Med 16,* 1849–1855, doi:10.1007/s11739-021-02702-2 (2021). CrossRef Google Scholar

13. ↵Jackson, L. A., Jackson, M. L., Nelson, J. C., Neuzil, K. M. & Weiss, N. S. Prove di pregiudizi nelle stime dell'efficacia del vaccino antinfluenzale negli anziani. *Int J Epidemiol* **35**, 337–344,doi:10.1093/ije/dyi274 (2006). CrossRef PubMed Rete della scienza Google Scholar

14. ↵Organizzazione Mondiale della Sanità. *Gestione clinica COVID-19: guida vivente*. Disponibile da:https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1. Accesso il: 31 maggio 2021. (2021). Google Scholar

15. ↵Organizzazione Mondiale della Sanità. *Linee guida internazionali per la certificazione e la classificazione (codifica) del COVID-19 come causa di morte*. Disponibile da:https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-EN.pdf? ua=1. Numero del documento: OMS/HQ/DDI/DNA/CAT. Accesso il 31 maggio 2021. (2021). Google Scholar

16. ↵Abu-Raddad, L. J. et al. Caratterizzazione dell'epidemia di SARS-CoV-2 in fase avanzata del Qatar.*Sci Rep 11,* 6233, doi:10.1038/s41598-021-85428-7 (2021). CrossRef PubMed Google Scholar

17. ↵Chemaitelly, H. et al. Declino della protezione del vaccino BNT162b2 contro l'infezione da SARS-CoV-2 in Qatar. *N Engl J Med* **385**, e83, doi:10.1056/NEJMoa2114114 (2021). CrossRef PubMed Google Scholar

18. Chemaitelly, H., Bertollini, R., Abu-Raddad, L. J. & Gruppo di studio nazionale per l'epidemiologia del Covid. Efficacia dell'immunità naturale contro la reinfezione da SARS-CoV-2 con la variante beta. *N Engl J Med* **385**, 2585-2586, doi:10.1056/NEJMc2110300 (2021). CrossRef Google Scholar

19. ↵Abu-Raddad, L. J., Chemaitelly, H., Butt, A. A. & Gruppo di studio nazionale per la vaccinazione contro il Covid. Efficacia del vaccino Covid-19 BNT162b2 contro le varianti B.1.1.7 e B.1.351. *N Engl J Med* **385**, 187–189, doi:10.1056/NEJMc2104974 (2021). CrossRef PubMed Google Scholar

20. ↵Chemaitelly, H. et al. mRNA-1273 efficacia del vaccino COVID-19 contro le varianti B.1.1.7 e B.1.351 e la grave malattia COVID-19 in Qatar. *Nat Med 27,* 1614–1621,doi:10.1038/s41591-021-01446-y (2021). CrossRef PubMed Google Scholar

21. Abu-Raddad, L. J. et al. Effetto dei booster del vaccino mRNA contro l'infezione da SARS-CoV-2 Omicron in Qatar. *N Engl J Med*, doi:10.1056/NEJMoa2200797 (2022). CrossRef Google Scholar

22. ↵Abu-Raddad, L. J., Chemaitelly, H., Bertollini, R. & Gruppo di studio nazionale per la vaccinazione contro il Covid. Efficacia dei vaccini mRNA-1273 e BNT162b2 in Qatar. *N Engl J Med*,doi:10.1056/NEJMc2117933 (2022). CrossRef Google Scholar

23. ↵Jackson, M. L. & Nelson, J. C. Il design negativo al test per stimare l'efficacia del vaccino antinfluenzale. *Vaccino 31,* 2165–2168, doi:10.1016/j.vaccine.2013.02.053 (2013). CrossRef PubMed Rete della scienza Google Scholar

24. ↵Verani, J. R. et al. Studi di efficacia del vaccino caso-controllo: preparazione, progettazione e arruolamento di casi e controlli. *Vaccino* **35**, 3295–3302, doi:10.1016/j.vaccine.2017.04.037 (2017). CrossRef PubMed Google Scholar

25. ↵Abu-Raddad, L. J., Chemaitelly, H., Bertollini, R. & Gruppo di studio nazionale per la vaccinazione contro il Covid. Efficacia del vaccino mRNA-1273 in calanza contro l'infezione da SARS-CoV-2 in Qatar. *N Engl J Med*, doi:10.1056/NEJMc2119432 (2022). CrossRef Google Scholar

26. Altarawneh, H. N. et al. Effetto di precedenti infezioni, vaccinazioni e immunità ibrida contro le infezioni sintomatiche da BA.1 e BA.2 Omicron e grave COVID-19 in Qatar. *medRxiv*, 2022.2003.2022.22272745, doi:10.1101/2022.03.22.22272745 (2022). Testo integrale astratto/GRATUITO Google Scholar

27. Tang, P. et al. Efficacia del vaccino BNT162b2 e mRNA-1273 COVID-19 contro la variante SARS-CoV-2 Delta in Qatar. *Nat Med 27,* 2136–2143, doi:10.1038/s41591-021-01583-4 (2021). CrossRef PubMed Google Scholar

28. ↵Chemaitelly, H. et al. Durata della protezione del vaccino mRNA contro le sottovarianti SARS-CoV-2 Omicron BA.1 e BA.2 in Qatar. *medRxiv*, 2022.2003.2013.22272308,doi:10.1101/2022.03.13.22272308 (2022). Testo integrale astratto/GRATUITO Google Scholar

29. ↵Abu-Raddad, L. J. et al. Introduzione ed espansione della variante SARS-CoV-2 B.1.1.7 e delle reinfezioni in Qatar: uno studio di coorte rappresentativo a livello nazionale. *PLoS Med* **18**, e1003879,doi:10.1371/journal.pmed.1003879 (2021). CrossRef Google Scholar

30. Progetto nazionale di sorveglianza per varianti di preoccupazione e sequenziamento del genoma virale.*Dati di sequenziamento del genoma virale Qatar. Dati su campioni raccolti casualmente*.https://www.gisaid.org/phylodynamics/global/nextstrain/, <https://www.gisaid.org/phylodynamics/global/nextstrain/> (2021). Google Scholar

31. Hasan, M. R. et al. La genotipizzazione SARS-CoV-2 in tempo reale mediante PCR multiplex ad alta produttività rivela l'epidemiologia delle varianti di preoccupazione in Qatar. *medRxiv*, 2021.2007.2018.21260718, doi:10.1101/2021.07.18.21260718 (2021). Testo integrale astratto/GRATUITO Google Scholar

32. ↵Benslimane, F. M. et al. Un anno di SARS-CoV-2: caratterizzazione genomica dell'epidemia di COVID-19 in Qatar. *La cellula anteriore infetta il microbiolo 11,* 768883, doi:10.3389/fcimb.2021.768883 (2021). CrossRef Google Scholar

33. ↵Ayoub, H. H. et al. Modellazione matematica dell'epidemia di SARS-CoV-2 in Qatar e del suo impatto sulla risposta nazionale al COVID-19. *J Glob Health 11,* 05005,doi:10.7189/jogh.11.05005 (2021). CrossRef Google Scholar

34. Coyle, P. V. et al. Sieroprevalenza SARS-CoV-2 nella popolazione urbana del Qatar: un'analisi del test anticorpale su un campione di 112.941 individui. *iScience 24,* 102646,doi:10.1016/j.isci.2021.102646 (2021). CrossRef Google Scholar

35. Al-Thani, M. H. et al. L'infezione da SARS-CoV-2 è all'immunità di gregge nel segmento maggioritario della popolazione del Qatar. *Apri Forum Infect Dis 8,* ofab221, doi:10.1093/ofid/ofab221 (2021). CrossRef Google Scholar

36. ↵Jeremijenko, A. et al. Immunità di gregge contro la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 2 Infezione da coronavirus in 10 comunità, Qatar. *Emerg Infect Dis 27,* 1343–1352,doi:10.3201/eid2705.204365 (2021). CrossRef Google Scholar

37. ↵Abu-Raddad, L. J. et al. Protezione del vaccino Pfizer-BioNTech mRNA BNT162b2 Covid-19 contro varianti di preoccupazione dopo una contro due dosi. *J Travel Med 28,* doi:10.1093/jtm/taab083 (2021). CrossRef Google Scholar

38. ↵Austin, P. C. Utilizzo della differenza standardizzata per confrontare la prevalenza di una variabile binaria tra due gruppi nella ricerca osservazionale. *Comunicazioni in statistica - Simulazione e calcolo* **38**, 1228-1234, doi:10.1080/03610910902859574 (2009). CrossRef Rete della scienza Google Scholar

39. ↵Jacoby, P. & Kelly, H. È necessario regolare l'ora del calendario in un design negativo di prova?: Rispondendo a: Jackson ML, Nelson JC. Il progetto negativo del test per stimare l'efficacia del vaccino antinfluenzale. Vaccino 2013;31(aprile (17)):2165-8. *Vaccino* **32**, 2942,doi:10.1016/j.vaccino.2013.08.048 (2014). CrossRef Google Scholar

40. ↵Belingheri, M., Paladino, M. E., Latocca, R., De Vito, G. & Riva, M. A. Associazione tra vaccinazione contro l'influenza stagionale e COVID-19 tra gli operatori sanitari. *Occup Med (Lond)* **70.665**–671, doi:10.1093/occmed/kqaa197 (2020). CrossRef Google Scholar

41. ↵Kissling, E. et al. Assenza di associazione tra vaccinazione antinfluenzale 2019-20 e COVID-19: risultati del progetto europeo di assistenza primaria I-MOVE-COVID-19, marzo-agosto 2020. *Influenza Altri virus respiratori* **15**, 429-438, doi:10.1111/irv.12839 (2021). CrossRef Google Scholar

42. ↵Erismis, B. et al. Effetto annuale della vaccinazione antinfluenzale sulla suscettibilità all'infezione da COVID-19. *Cent Eur J Public Health 29,* 14–17, doi:10.21101/cejph.a6573 (2021). CrossRef Google Scholar

43. Horns, F., Dekker, C. L. & Quake, S. R. Attivazione delle cellule B della memoria, ampi anticorpi antiinfluenzali e attivazione degli astanti rivelata dalla trascrittomica a cella singola. *Rappresentante cellulare* **30.905**-913 e906, doi:10.1016/j.celrep.2019.12.063 (2020). CrossRef Google Scholar

44. Salem, M. L. & El-Hennawy, D. Il possibile effetto adiuvante benefico del vaccino antinfluenzale per ridurre al minimo la gravità del COVID-19. *Med Hypotheses* **140**, 109752,doi:10.1016/j.mehy.2020.109752 (2020). CrossRef PubMed Google Scholar

45. Lee, C. H. et al. Potenziale reattività crociata delle cellule T CD8+ contro la SARS-CoV-2 conferita da altri ceppi di coronavirus. *Immunolo anteriore 11,* 579480,

doi:10.3389/fimmu.2020.579480 (2020). CrossRef PubMed Google Scholar

46. Benn, C. S., Netea, M. G., Selin, L. K. & Aaby, P. Un piccolo colpo - un grande effetto: immunomodulazione non specifica da parte dei vaccini. *Tendenze Immunol* **34**, 431–439, doi:10.1016/j.it.2013.04.004 (2013). CrossRef PubMed Rete della scienza Google Scholar

47. ↵Netea, M. G. et al. Definire l'immunità addestrata e il suo ruolo nella salute e nelle malattie. *Nat Rev Immunol* **20**, 375-388, doi:10.1038/s41577-020-0285-6 (2020). CrossRef PubMed Google Scholar

48. ↵Andrews, N. et al. Efficacia del vaccino Covid-19 contro la variante Omicron (B.1.1.529). *New England Journal of Medicine*, doi:10.1056/NEJMoa2119451 (2022). CrossRef PubMed Google Scholar

49. Feikin, D. R. et al. Durata dell'efficacia dei vaccini contro l'infezione da SARS-CoV-2 e la malattia da COVID-19: risultati di una revisione sistematica e di una meta-regressione. *Lancetta* **399,924**–944, doi:10.1016/S0140-6736(22)00152-0 (2022). CrossRef PubMed Google Scholar

50. ↵Chemaitelly, H. & Abu-Raddad, L. J. Efficacia in diminuzione dei vaccini COVID-19. *Lancet399*, 771–773, doi:10.1016/S0140-6736(22)00277-X (2022). CrossRef Google Scholar

51. ↵Altarawneh, H. N. et al. Protezione contro la variante di Omicron dalla precedente infezione da SARS-CoV-2. *N Engl J Med*, doi:10.1056/NEJMc2200133 (2022). CrossRef PubMed Google Scholar

52. ↵Ayoub, H. H. et al. Stimare la protezione offerta da precedenti infezioni nella prevenzione della reinfezione: applicazione del progetto dello studio negativo al test. *medRxiv*, 2022.2001.2002.22268622,doi:10.1101/2022.01.02.22268622 (2022). Testo integrale astratto/GRATUITO Google Scholar

Referenze

1. ↵Organizzazione Mondiale della Sanità. *Gestione clinica COVID-19: guida vivente*. Disponibile da: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1. Accesso: 15 maggio 2021. 2021. Google Scholar

2. ↵Organizzazione Mondiale della Sanità. *Linee guida internazionali per la certificazione e la classificazione (codifica) del COVID-19 come causa di morte*. Disponibile da:https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-EN.pdf? ua=1. Numero del documento: OMS/HQ/DDI/DNA/CAT. Accesso il 31 maggio 2021.2021. Google Scholar

Torna all'inizio

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info